

蝶と蛾 *Tyô to Ga* 45 (1): 59-61, March 1994

## サハリンで採集されたキタヤチヒョウモン (新称) *Clossiana frigga* について

高橋 真弓

420 静岡市北安東 5-13-11

### A record of *Clossiana frigga* (Thunberg) (Nymphalidae) from Sakhalin, Russia

Mayumi TAKAHASHI

Kita-andô 5-13-11, Shizuoka-shi, Shizuoka, 420 Japan

**Abstract** A male specimen of *Clossiana frigga* (Thunberg, 1791) is recorded from Sakhalin, Russia. This may be the first record of this species from Sakhalin.

**Key words** Lepidoptera, Nymphalidae, *Clossiana frigga*, Sakhalin, distribution.

サハリンには *Clossiana* 属に含まれる数種の小型ヒョウモン類が分布しているが, *Clossiana frigga* (Thunberg, 1791) キタヤチヒョウモン (新称) はおそらく未記録と思われるので, その記録を報告する. 採集データはつぎのとおりである.


1 ♂, Окрестность, Залив Пилтун, Охинский Район, Сахалин, 12-18 июля, 1991 г., соб. А. М. Басарукин.

この個体はサハリン在住の生物学者, アナトリー・М・バサルーキン氏によって, 1991 年 7 月 12-18 日に, サハリン北部オヒンスキー地方のピリトゥン湾沿岸で採集されたものである. この地点はオハ市 (Okha) 南方の太平洋側にあり, ほぼ北緯 53 度に位置する.

この標本は, 1992 年 7 月 28 日に筆者がユジノ・サハリンスク市の同氏宅を訪れたさい恵与されたもので, 前翅長 20.2 mm, 開張 36.1 mm のかなり小型の個体である. ちなみに筆者の所有する東シベリアのヤクーツク市周辺で採集された 1 ♂ 1 ♀ (E. L. カイムーク女史から送られたもの) の前翅長と開張は, それぞれ ♂ 22.7 mm, 41.0 mm, ♀ 24.4 mm, ♀ 45.1 mm である. なお, 地理的変異の扱いについては今後の研究をまつことにしたい.

本種はアサヒヒョウモン *C. freija* などとともに周極種 (circum-polar species) に含まれ, ヨーロッパからシベリアを経て北米大陸北部にかけて分布し, 主として泥炭湿地に生息する. 本種がサハリンから発見されたことは, とくにその北部においてまだいくつかの周極種が発見される可能性を示していると思う. 和名をキタヤチヒョウモンとした理由は, その生息地の性格と, その分布地域がヤチヒョウモン *Proclossiana eunomia* よりも北方に偏在することによる.

この報告に当たり, 貴重な標本を恵与された A. M. バサルーキン氏および E. L. カイムーク女史に深く感謝する.



Figs 1-6. *Clossiana frigga* (Thunberg). 1. ♂, Vicinity of Pil'tun Bay, N. Sakhalin, July, 12-18. 1991, A. M. Basarukin leg. 2. *Ditto*, underside. 3. ♂, Leno-Amginskoe, 50 km ENE from Yakutsk, E. Siberia, June 9, 1990, E.L. Kaymuk leg. 4. *Ditto*, underside. 5. ♀, Khaptagay, 35 km SSE from Yakutsk, E. Siberia, June 11, 1975, E.L. Kaymuk leg. 6. *Ditto*, underside.

## 文 献

- D'Abrera, B., 1992. *Butterflies of the Holarctic Region* 2. 334 pp. Hill House, Victoria.  
 Henriksen, H.J. & Ib Kreutzer, 1982. *The Butterflies of Scandinavia in Nature*. 215 pp. Skandinavisk Bogforlag, Odense.  
 Higgins, L.G. & N.D. Riley, 1970. *A Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe*. 380 pp. Houghton Mifflin Company Boston, Boston.  
 Куренцов, А. И., 1970. Булавоусые чешуекрылые дальнего востока СССР. 164 стр., 14 таб. Издательство "Наука", Ленинградское отделение, Ленинград (СССР).  
 クレンツォフ (著), 阿部光伸 (訳), 1988. 極東のチョウ. 150 pp., 14 pls. 文一総合出版, 東京.

## Summary

A male of *Clossiana frigga* (Thunberg) (Nymphalidae) was collected in northern part of Sakhalin, Russia. It may be the first record of this species from Sakhalin. The collecting site is vicinity of near Pil'tun Bay, south of Okha city, northern Sakhalin (53°N).

(Accepted October 23, 1993)